



PROTOCOLO DE INFUSIÓN DE TIMOGLOBULINA EN APLASIA MEDULAR/AGRANULOCITOSIS

Etiqueta de identificación del paciente

Fecha:

Día de Administración:

Firma y sello médico:

Peso:

Edad:

Diagnóstico:

Pre Medicación y Dosis subsiguientes:

Metilprednisolona _____mg diluidos en 50 mL de Solución Fisiológica a pasar en 30 minutos. **1 hora antes** de iniciar Timoglobulina.

Difenhidramina _____mg **c/6 horas EV**. Primera dosis administrar **1 hora antes** de iniciar Timoglobulina y **continuar c/6 Hs. Dosis Máx.: 50 mg por dosis.**

Paracetamol _____mg **c/_____horas VO**. Primera dosis administrar **1 hora antes** de iniciar Timoglobulina y continuar según indicado. **Dosis Máx.: 1 g por dosis.**

TIMOGLOBULINA: Reconstituir cada frasco ampolla de 25 mg con 5 mL de agua destilada, luego diluir en 100 mL de Solución Fisiológica y administrar EV en al menos 2 horas y titular (si tolerancia podría ser menor tiempo infusión). Preparar cada frasco ampolla inmediatamente antes de administrar. Estabilidad de la solución reconstituida o diluida: 24 horas en heladera. Repetir dicho procedimiento con cada frasco ampolla. Utilizar filtro de 0.22 micrones para la administración (el mismo se cambia una vez por día).

Total de F/A en el día

N° de Lote

Escribir lote o pegar sticker de Timoglobulina

Firma de Administración (incluir legajo)

Hora \ Fármaco	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	
Metilprednisolona																									
Difenhidramina																									
Paracetamol																									
Timoglobulina																									

NOTA: No transfundir componentes sanguíneos durante la infusión de Timoglobulina

