

PROPOFOL

Propofol 1% (10 mg/mL) ampolla 20 mL



PROPOFOL 10 mg/mL PURO

INDICACIÓN MÉDICA: Propofol PURO

PREPARACIÓN EN BOMBA DE JERINGA: ESTABILIDAD MÁXIMA 6 HS

PESO (kg)	DOSIS (mg/kg/hora)															
	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
	Velocidad de infusión (mL/hora)															
2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2
4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
5	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2
6	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2	2,1	2,3	2,4
7	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8
8	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
9	0,2	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6
10	0,3	0,5	0,8	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8	4
11	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4
12	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
13	0,3	0,7	1	1,3	1,6	2	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	5,2
14	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6
15	0,4	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,1	4,5	4,9	5,3	5,6	6
16	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6	6,4
17	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3	3,4	3,8	4,3	4,7	5,1	5,5	6	6,4	6,8
18	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5	5,4	5,9	6,3	6,8	7,2
19	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,3	3,8	4,3	4,8	5,2	5,7	6,2	6,7	7,1	7,6
20	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
22	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,5	6,1	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8
24	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9	9,6
26	0,7	1,3	2	2,6	3,3	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,2	7,8	8,5	9,1	9,8	10,4
28	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2
30	0,8	1,5	2,3	3	3,8	4,5	5,3	6	6,8	7,5	8,3	9	9,8	10,5	11,3	12
32	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	8,8	9,6	10,4	11,2	12	12,8
34	0,9	1,7	2,6	3,4	4,3	5,1	6	6,8	7,7	8,5	9,4	10,2	11,1	11,9	12,8	13,6
36	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4
38	1	1,9	2,9	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5	11,4	12,4	13,3	14,3	15,2
40	1	2	3,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	1,1	2,3	3,4	4,5	5,6	6,8	7,9	9	10,1	11,3	12,4	13,5	14,6	15,8	16,9	18
50	1,3	2,5	3,8	5	6,3	7,5	8,8	10	11,3	12,5	13,8	15	16,3	17,5	18,8	20
55	1,4	2,8	4,1	5,5	6,9	8,3	9,6	11	12,4	13,8	15,1	16,5	17,9	19,3	20,6	22
60	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24
70	1,8	3,5	5,3	7	8,8	10,5	12,3	14	15,8	17,5	19,3	21	22,8	24,5	26,3	28
80	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
90	2,3	4,5	6,8	9	11,3	13,5	15,8	18	20,3	22,5	24,8	27	29,3	31,5	33,8	36
100	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40

Autores: Cinqui G, Herrera M, Kijko I, Perez E, Galvan ME. V3. Última revisión: marzo 2024

Grupo de trabajo: Basílico H, Bruno F, Gallagher R, Krynski M, Pellegrini S, Selandari S, Zuazaga M

Área de Farmacia- Área de Terapia Intensiva- Comité de Medicamentos de Alto Riesgo

Tarjetas AS © 2024 by Cinqui G, Herrera M, Kijko I, Perez E, Galvan ME is licensed under CC BY-NC-ND 4.0